

أسباراجينيز Asparaginase



- يستخدم هذا الدواء لعلاج بعض أنواع السرطان. وهو عبارة عن سائل شفاف يتم حقنه عن طريق الوريد .
- أخبر طبيبك إذا كان لديك رد فعل غير عادي أو **حساسية** مسبقة للدواء قبل بدء العلاج .
- قد يؤخذ **فحص للدم** قبل كل جرعة. قد يتم تغيير جرعة وموعد العلاج الكيميائي بناءً على نتائج الفحوصات أو غيرها من الآثار الجانبية.
- **تجنب** تناول **الكحول** أثناء فترة العلاج حيث يزيد من خطر مشاكل الكبد.
- قد يسبب الدواء **العقم** لدى الرجال و **انقطاع الطمث** لدى النساء. إذا كنت تخطط لإنجاب الأطفال، يجب مناقشة ذلك مع طبيبك قبل العلاج.
- قد يضر هذا الدواء بالحيوانات المنوية ، ويمكن أن يضر بالجنين إذا تم استخدامه أثناء الحمل. فمن الأفضل استخدام **وسائل منع الحمل** أثناء فترة العلاج. يجب إخبار الطبيب فوراً إذا كنت حاملاً أو كانت زوجتك حاملاً، كما تمنع الرضاعة خلال فترة العلاج.
- قبل أن تتلقى أي علاج ، **أخبر** الطبيب أو طبيب الأسنان أو موفري الرعاية الصحية بأنك تتناول هذا الدواء.

نشرة توعية المرضى

مقتبس من دليل الادوية من وكالة كولومبيا البريطانية – كندا (بناءً على النسخة الإنجليزية بتاريخ أكتوبر ٢٠١١)
أعدها قسم الصيدلة الاكلينيكية بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان – النسخة الأولى – مايو ٢٠١٧

تغيرات في عدد كريات الدم :

هذا الدواء قد يحدث تغيرات مؤقتة في عدد كريات الدم. سيتابع طبيبك هذه التغيرات بعناية بإجراء فحوصات للدم. قد يتم تغيير أو تعديل جرعات العلاج في بعض الحالات.

الآثار الجانبية	العلاج
كريات الدم البيضاء هي المسؤولة عن مكافحة البكتيريا الضارة في الجسم التي تسبب العدوى ، و لذلك عند انخفاضها يكون المريض أكثر عرضة للعدوى .	للمساعدة في منع العدوى: • اغسل يديك باستمرار و بعد استعمال دورة المياه. • يجب الاهتمام بالجلد والفم. • تجنب التواجد بالأماكن المزدحمة، و بالقرب من المرضى. • قم بزيارة قسم الرعاية العاجلة بالمركز الوطني لعلاج و أبحاث السرطان فوراً عند أول علامة على وجود عدوى مثل الحمى (٣٨ درجة مئوية) ، أو رجفة، أو سعال، أو حرقة عند التبول.
تساعد الصفائح الدموية على تجلط الدم عند حدوث جروح، و لذلك عند انخفاضها يكون المريض أكثر عرضة للكدومات أو النزف بسهولة أكثر من المعتاد.	• حاول أن لا تعرض نفسك للكدومات، الجروح أو الحروق. • نظف أنفك بلطف. • لا تحك أنفك من الداخل. • تجنب الإمساك المعوي. • حافظ على نظافة الفم. نظف أسنانك بلطف بفرشاة أسنان ناعمة لأن اللثة قد تنزف بسهولة أكبر. • بعض الأدوية مثل الأسبرين أو الايبوبروفين أو مضادات الألم و الالتهابات الأخرى قد تزيد من خطر النزيف . • بالنسبة للآلام الطفيفة ، يمكنك تناول الباراسيتامول (البنادول®). • ارجع لطبيبك إذا كنت تتناول أيًا من هذه الأدوية بوصفة طبية .

الآثار الجانبية الوارد حدوثها و كيفية التعامل معها :

الآثار الجانبية	العلاج
قد تحدث حساسية أحياناً. علامات الحساسية تتضمن الطفح الجلدي أو الحكة أو الدوار أو سرعة ضربات القلب أو التورم في الوجه أو مشاكل في البلع أو التنفس. هذا التفاعل قد يحدث على الفور أو بعد عدة ساعات من تلقي العلاج .	أخبر ممرضك إذا حدث ذلك أثناء تلقي العلاج أو قم بزيارة قسم الرعاية العاجلة بالمركز الوطني لعلاج و أبحاث السرطان على الفور إذا حدث ذلك بعد مغادرة وحدة الإقامة القصيرة.
قد تشعر بألم في مكان وضع الإبرة.	ضع كمادات باردة على موضع الألم لمدة ١٥ - ٢٠ دقيقة عدة مرات في اليوم.
نادراً ما يحدث غثيان مع هذا الدواء .	
قد تشعر بفقدان الشهية وقد يستمر لفترة بعد الانتهاء من العلاج .	
عادة ما يحدث شعور بالتعب و الخمول .	• لا تقود السيارة أو تقوم بأي نشاط بدني زائد أو يحتاج إلى تركيز إذا كنت تشعر بالتعب .
فقدان الشعر لا يحدث مع هذا الدواء .	

نشرة توعية المرضى

مقتبس من دليل الادوية من وكالة كولومبيا البريطانية - كندا (بناءً على النسخة الإنجليزية بتاريخ أكتوبر ٢٠١١) أعدتها قسم الصيدلة الاكلينيكية بالمركز الوطني لعلاج و أبحاث السرطان - النسخة الأولى - مايو ٢٠١٧

راجع طبيبك أو اطلب مساعدة طارئة فوراً إذا كان لديك :

- علامات **الحساسية** بعد فترة وجيزة من العلاج بما في ذلك الطفح الجلدي، أو الحكة أو الدوار، أو سرعة ضربات القلب أو التورم في الوجه أو مشاكل في البلع أو التنفس.
- علامات **جلطة/سكتة دماغية** مثل بداية مفاجئة لصداع شديد، أو تغيرات في البصر أو صعوبة في الكلام أو تغير درجة الوعي، أو ضعف أو تنميل في الذراع أو الساق.
- **ألم شديد** و مفاجئ بالبطن.
- شعور شديد **بالعطش، أو زيادة** في كمية أو عدد مرات التبول.
- علامات **النزيف** مثل براز أسود أو دم في البول أو بقع حمراء على الجلد أو كدمات متكررة.
- دلائل على **وجود تجلط للدم** مثل إحساس بالألم أو التصلب في أحد الأوعية الدموية، أو انتفاخ وألم في عضلة الساق، أو حدوث سعال مفاجئ، أو ألم في الصدر، أو ضيق في التنفس.
- **تشنجات أو فقدان الوعي.**
- علامات على وجود **عدوى** مثل الحمى أكثر من ٣٨ درجة مئوية ، أو رجفة، أو التهاب شديد في الحلق، أو سعال مصاحب بافرازات سميكة ، أو ألم/ حرق، أو تغير لون أو رائحة البول، أو تقرحات جلدية مؤلمة أو متورمة.

راجع طبيبك في أقرب وقت ممكن (خلال ساعات العمل) إذا كان لديك أي من التالي:

- علامات **مشاكل بالكبد** مثل اصفرار بالعين أو الجلد، أو براز أبيض.
- علامات **لمشاكل في الكلى** مثل ألم في أسفل الظهر أو ألم في الجانب، أو تورم القدمين أو أسفل الساقين.
- **دوخة، دوار أو شعور بالإغماء.**
- **تنميل أو وخز** في القدمين أو اليدين.

قم باستشارة طبيبك في حالة استمرار أي من الأعراض التالية:

- غثيان، أو قيء أو إسهال شديد لا يمكن التحكم بهم.
- لمرضى السكري: عدم انتظام سكر الدم.
- الصداع المستمر بالرغم من تناول الباراسيتامول (البنادول *).
- ظهور سريع للكدمات أو حدوث نزيف طفيف.
- احمرار، تورم أو ألم أو تقرحات حيث تم وضع الإبرة.

قم بالإبلاغ عن أي مشاكل إضافية لطبيبك

نشرة توعية المرضى

مقتبس من دليل الادوية من وكالة كولومبيا البريطانية – كندا (بناءً على النسخة الإنجليزية بتاريخ أكتوبر ٢٠١١)
أعدها قسم الصيدلة الاكلينيكية بالمركز الوطني لعلاج و أبحاث السرطان – النسخة الأولى – مايو ٢٠١٧



هذه النشرة مختصرة و تحتوي على معلومات هامة لمساعدتك على فهم و تناول العلاج الموصوف لك بالطريقة الصحيحة. نحن على استعداد لتلقي استفساراتكم .

للحالات الطارئة، يرجى الاتصال بـ:

- وحدة الرعاية العاجلة بالمركز الوطني لعلاج و أبحاث السرطان على الرقم: ٤٤٣٩٧١٧٩ (٢٤ ساعة ، طوال أيام الأسبوع)

لأي استفسارات أخرى ، يرجى الاتصال بـ:

- **طبيبك المعالج** (من الساعة ٧ صباحاً حتى ٣ مساءً)
- **قسم الصيدلة الإكلينيكية** على الرقم: ٤٤٣٩٧٢٣٩ (من الأحد – الخميس ، من الساعة ٧ صباحاً – ٣ مساءً)
- **صيدلية العيادات الخارجية** على أحد الأرقام التالية: ٤٤٣٩٧٥٣١, ٤٤٣٩٧٨٢٥ (من الأحد – الخميس ، من الساعة ٧ صباحاً – ٣ مساءً)

قسم الصيدلة

نشرة توعية المرضى

مقتبس من دليل الادوية من وكالة كولومبيا البريطانية – كندا (بناءً على النسخة الإنجليزية بتاريخ أكتوبر ٢٠١١)
أعدها قسم الصيدلة الإكلينيكية بالمركز الوطني لعلاج و أبحاث السرطان – النسخة الأولى – مايو ٢٠١٧