

أقراص الأريبيرازول

Aripiprazole Tablets



What is aripiprazole used for?

Aripiprazole is mainly used to help treat the symptoms of psychosis, Schizophrenia, mania, bipolar mood disorder, and depression, in combination with other medicines.

What is the usual dose of aripiprazole?

The usual dose of aripiprazole is 10mg to 30mg a day. **(The tablet can be taken in the morning or evening).**

How and when should I take aripiprazole?

Swallow the tablet(s) with at least half a glass of water whilst sitting or standing.

How long will aripiprazole take to work?

It will usually start working within a couple of weeks but the effect continues to build over weeks. Your doctor will review your dose and adjust it accordingly.

How long will I need to keep taking aripiprazole?

It depends on the symptoms that you are taking the medication for. Any plan to reduce or stop your medication must be discussed and planned in consultation with your doctor.

Can I stop taking aripiprazole suddenly?

Aripiprazole is not addictive. However, it is advisable you do not stop taking Aripiprazole suddenly, even if you feel better. Your symptoms may return (within weeks or months of stopping Aripiprazole). Your symptoms can return if aripiprazole is stopped too early.

What should I do if I forget to take a dose of aripiprazole?

Take the missed dose as soon as you remember, unless it is less than 12 hours of your next dose. If you remember less than 12 hours before your next scheduled dose, just take the next dose as normal. Do not try to catch up by taking two doses at once as you may experience side-effects.

Can I drink alcohol while I am taking aripiprazole?

Drinking alcohol while taking aripiprazole may make you feel sleepy.

What sort of side-effects might I experience while I am taking aripiprazole?

Some people experience:

- Restlessness,
- Stomach upset,
- Constipation,
- Headache,
- Difficulty in sleeping well, Blurred vision, and Tremors or shakes.

Contact your doctor immediately if you experience:

- Sudden fever,
- Muscle stiffness
- shakes
- Seizures.

This is especially important in the first few days of starting the medication and when increasing the dosage.

Do not be worried by this list of side effects. Many people do not experience any side effects at all. Others experience some effects that are not listed here. If you think you might

have a side effect to your medicine, ask your doctor, pharmacist, or nurse. Most side effects can be treated easily.

Can I operate machinery while I am taking aripiprazole?

You may feel a bit sleepy at first when taking aripiprazole. It may slow down your reaction times. Until this wears off, or you know how aripiprazole affects you, be careful while you drive or operate machinery.

ما هي الآثار الجانبية التي قد تحدث إذا كنت أتناول دواء أريبيريازول؟

- يكون البعض من الناس عرضة للإصابة بما يلي:
- الشعور المستمر بالتوتر وعدم القدرة على الجلوس لفترة طويلة.
 - الشعور بعدم الارتياح
 - اضطراب المعدة.
 - الإمساك.
 - الصداع.
 - صعوبة في النوم.
 - عدم وضوح الرؤية الرعشة أو التشنج.

عليك باستشارة طبيبك في اليوم التالي إذا تعرضت للإصابة بما يلي:

الحمى المفاجئة وتيبس العضلات أو الرعشة أو التشنجات.

هذا مهم خصوصاً في الأيام القليلة الأولى بعد بدء الدواء و عند زيادة الجرعة.

لا ينبغي عليك أن تشعر بالقلق من هذا القائمة من الآثار الجانبية. لا يتعرض بعض الناس لأي من الآثار الجانبية على الإطلاق، والبعض الآخر قد يصاب ببعض الآثار الجانبية الغير مذكوره هنا. إذا كنت تعتقد أن لديك مشكلة مع الآثار الجانبية، فعليك باستشارة أي من الطبيب، أو الصيدلي أو الممرض. يستطيع الطبيب بسهولة وصف أدوية مضادة لهذه الأعراض الجانبية.

هل يمكنني القيادة،أو إدارة أو تشغيل الآلات أثناء تناول دواء أريبيريازول؟

قد تشعر بالنعاس قليلاً في البداية عند تناول دواء أريبيريازول. قد يبطئ الدواء من زمن رد الفعل الخاص بك إلى حين معرفتك بكيفية تأثير دواء أريبيريازول عليك، كن حذراً أثناء القيادة أو تشغيل الآلات.

ما هي استخدامات دواء أريبيريازول؟

يستخدم أريبيريازول أساساً للمساعدة في علاج أعراض الذهان والغصام، والهوس، واضطراب المزاج ثنائي القطب كما يمكن استخدامه في حالات الاكتئاب كدواء مساعد.

ما هي الجرعة المعتادة من أريبيريازول؟

الجرعة المعتادة من أريبيريازول حوالي ١٠-٣٠ مج يومياً (يمكن تناول الجرعة في الصباح أو في المساء).

ما هي كيفية ووقت تناول دواء أريبيريازول؟

ابتلع الأقراص مع نصف كوب على الأقل من المياه سواء كان ذلك في وضع الجلوس أو الوقوف.

كم من الوقت يلزم قبل عمل المادة الفعالة لدواء أريبيريازول؟

عادة يبدأ الدواء في العمل في غضون أسبوعين. ويستمر ظهور هذا التأثير على مدى الأسابيع القليلة المقبلة طبيبك سوف يراجع جرعتك و يعدلها.

كم من الوقت يلزمني للاستمرار في تناول دواء أريبيريازول؟

يعتمد هذا على ماهية الأعراض التي تتناول الدواء من أجلها. يمكنك التحدث مع طبيبك حول هذا الموضوع. يمكن أن يستمر تناول الدواء لأشهر أو سنوات للوقاية من حدوث انتكاسات مستقبلية.

هل يمكنني التوقف عن تناول أريبيريازول فجأة؟

لا يعتبر دواء أريبيريازول عقار إدماني ولكن لا تتوقف عن أخذه فجأة، حتى لو كنت تشعر بتحسن. يمكن أن تعود الأعراض إذا توقفت عن تناول أريبيريازول في وقت مبكر جداً. قد يحدث هذا بعد أسابيع أو حتى شهور بعد التوقف عن تناول دواء أريبيريازول.

ما الذي ينبغي على فعله إذا نسيت تناول جرعة من دواء أريبيريازول في الوقت المناسب؟

عليك بتناول الجرعة المنسية في أقرب وقت بشرط أن يتبقى أكثر من ١٢ ساعة على موعد أخذ الجرعة التالية في وقتها المعتاد اذا تذكرت بعد هذا الوقت، فقط تناول الجرعة التالية كما هي. لا تحاول تعويض ذلك بأخذ جرعتين في وقت واحد حتى لا تكون عرضة لمزيد من الآثار الجانبية.

هل أستطيع تناول المشروبات الكحولية أثناء دواء الأريبيريازول؟

شرب الكحول أثناء تناول دواء أريبيريازول قد يجعلك تشعر بالنعاس بصورة أكبر