

أقراص الأميسولبرايد

Amisulpride Tablets



What is amisulpride used for?

Amisulpride is mainly used to help treat the symptoms of psychosis, schizophrenia, and mania, and to help stop the symptoms from returning. It can also be used to help dementia, obsessive thoughts, and behavioral disorders.

What is the usual dose of amisulpride?

The usual dose of amisulpride is around 400mg to 800mg a day. However, the daily dose can be up to 1200mg a day and should be lower in older people.

How and when should I take amisulpride?

Swallow the tablets with at least half a glass of water whilst sitting or standing.

How long will amisulpride take to work?

It will usually start working within couple of days. The effect then builds over the next few weeks.

How long will I need to keep taking amisulpride?

This will depend on how well your symptoms are controlled. Talk to your doctor for specific instructions.

Can I stop taking amisulpride suddenly?

Amisulpride is not addictive, but it is advisable that you do not stop taking it suddenly, even if you feel better. Your symptoms can return if it is stopped too early; reoccurrence of symptoms may happen weeks or even months after stopping amisulpride.

What should I do if I forget to take a dose of amisulpride?

Take the missed dose as soon as you remember, unless it is within 4 hours of your next dose; if it is within 4 hours of your next dose, just take the next dose as normal. Do not try to catch up by taking two doses at once as you may have negative side effects.

Can I drink alcohol while I am taking amisulpride?

Drinking alcohol while taking amisulpride may make you feel sleepy.

What side-effects might I experience if I am taking amisulpride?

Many people experience:

- Muscles stiffness
- A slight shake or tremor
- Feeling restless
- Sleepiness during the day.

Some people also experience:

- Low blood pressure when standing,
- Headaches,
- Women may have breast changes and irregular or no periods
- Constipation.

Contact your doctor immediately if you develop:

- Sudden fever
- Muscle stiffness or shakes.

This is especially important in the first days of the treatment, or when increasing the dosage.

Do not be worried by this list of side effects. Some people experience no side effects while others will experience side effects not listed here. Most side effects can be relieved by different modalities of treatment.

If you think you may experience a side effect to this medicine, speak with your physician or pharmacist.

Can I drive or operate machinery while I am taking amisulpride?

You may feel a bit sleepy at first when taking amisulpride. It may slow down your reaction times. Until this wears off, or you know how amisulpride affects you, do not drive or operate machinery.

ما هي الآثار الجانبية التي قد تحدث إذا كنت أتناول دواء الأَميسولبرَايد؟

- من أكثر الأعراض شيوعاً:
- وجود تيبس بالعضلات.
- رعشة خفيفة أو تشنج .
- الشّعور بعدم الارتياح .
- النعاس أثناء النهار.
- يمكن أن يكون بعض الناس أيضاً عرضة للإصابة بما يلي:
- انخفاض ضغط الدم عند الوقوف .
- الصداع .
- قد تشعر المرأة بتغيرات في الثدي وعدم انتظام في أو انقطاع الدورة الشهرية .
- الإمساك .

قم باستشارة طبيبك مباشرة في حال تعرضك للأعراض التالية وبخاصة في الأيام الأولى من العلاج أو عند زيادة الجرعات من قبل طبيبك المختص :

- الحمى المفاجئة .
- تيبس العضلات.
- الرعشة.

لا ينبغي عليك أن تشعر بالقلق من هذه القائمة من الآثار الجانبية. في كثير من الأحيان لا يتعرض الناس لأي من الآثار الجانبية على الإطلاق، كما تتوفر العلاجات المناسبة لكثير من الأعراض الجانبية. إذا كنت تعتقد أن لديك مشكلة مع الآثار الجانبية، فعليك باستشارة أي من الطبيب ، أو الصيدلي .

هل يمكنني القيادة، أو إدارة أو تشغيل الآلات أثناء تناول دواء الأَميسولبرَايد؟

قد تشعر بالنعاس قليلاً في البداية عند تناول دواء الأَميسولبرَايد. قد يبطئ الدواء من زمن رد الفعل الخاص بك. إلى حين معرفتك بكيفية تأثير دواء الأَميسولبرَايد عليك، كن حذراً أثناء القيادة أو تشغيل الآلات.

ما هي استخدامات دواء الأَميسولبرَايد؟
يستخدم دواء الأَميسولبرَايد أساساً للمساعدة في علاج أعراض الذهان والفصام والهوس، وللمساعدة في وقف عودة تلك الأعراض. يمكن أيضاً أن يستخدم للمساعدة في علاج أعراض فقدان الذاكرة، والأفكار الوسواسية والاضطرابات السلوكية.

ما هي الجرعة المعتادة لدواء الأَميسولبرَايد؟
الجرعة المعتادة لدواء الأَميسولبرَايد هي من ٤٠٠ مج إلى ٨٠٠ مج في اليوم. يمكن أن تصل الجرعة إلى ١٢٠٠ مج في اليوم، وينبغي أن تكون أقل من ذلك لكبار السن.

ما هي كيفية ووقت تناول دواء الأَميسولبرَايد؟
ابتلع الأقراص مع نصف كوب على الأقل من المياه سواء كان ذلك في وضع الجلوس أو الوقوف.

كم من الوقت يلزم قبل عمل المادة الفعالة لدواء الأَميسولبرَايد؟

عادة ما يبدأ الدواء في العمل في غضون بضعة أيام. ثم يظهر التأثير على مدى الأسابيع القليلة المقبلة.

كم من الوقت يلزمني للاستمرار في تناول دواء الأَميسولبرَايد؟

يعتمد هذا على مدى التحكم والسيطرة على الأعراض الخاصة بك. يمكنك التحدث مع طبيبك حول هذا الموضوع .

هل يمكنني التوقف عن تناول دواء الأَميسولبرَايد فجأة؟

لا يعتبر دواء الأَميسولبرَايد عقار إدمانيّ ولكن لا تتوقف عن أخذه فجأة، حتى لو كنت تشعر بتحسن. يمكن أن تعود الأعراض إذا توقفت في وقت مبكر جداً. قد يحدث هذا بعد أسابيع أو حتى شهور بعد التوقف عن تناول دواء الأَميسولبرَايد.

ما الذي ينبغي علي فعله إذا نسيت تناول جرعة من دواء الأَميسولبرَايد في الوقت المناسب؟

عليك بتناول الجرعة المنسية في أقرب وقت عند تذكرك – وحتى مرور ٣ إلى ٤ ساعات قبل تناول الجرعة التالية. لا تحاول تعويض نسيان الجرعة بأخذ جرعتين في وقت واحد حتى لا تكون عرضة للمزيد من الآثار الجانبية.

هل أستطيع تناول المشروبات الكحولية أثناء دواء الأَميسولبرَايد؟

شرب الكحول أثناء أخذ دواء الأَميسولبرَايد قد يجعلك تشعر بالنعاس أكثر.