

أقراص الكلوزابين

Clozapine tablets



What is Clozapine used for?

Clozapine is mainly used to help treat the symptoms of schizophrenia in individuals who have been unresponsive to treatment using other antipsychotics.

What is the usual dose of Clozapine?

The usual dose of clozapine is 300mg to 600mg a day, but can be up to 900mg a day.

How and when should I take Clozapine?

Swallow the tablets with at least half a glass of water whilst sitting or standing. Taking it at mealtimes may make it easier for you to remember.

How long will I need to keep taking it?

If it works for you, you might want to take it for many years. Talk to your doctor about this.

How long will Clozapine need to work?

It may take several weeks before Clozapine starts working, and it may take you several months to feel the full effect of the medication.

Can I stop taking Clozapine suddenly?

Clozapine is not addictive but do not stop taking it suddenly, even if you feel better. Your symptoms can return if clozapine is stopped too early. Symptoms may reoccur within weeks or even months after stopping. If you have a blood problem, you may need to stop taking this medication, but you should not change your treatment plan without speaking to your doctor.

What should I do if I forget to take a dose of Clozapine?

Take the missed dose as soon as you remember, unless it is within 4 to 6 hours of your next dose. If you remember within 4 to 6 hours of your next dose, just take the next dose as normal. Do not try to catch up by taking two doses at once as you may experience side-effects. If you miss more than two days (48 hours) of medication, you will need to consult your doctor or pharmacist.

Can I drink alcohol or smoke while I am taking Clozapine?

If you drink alcohol while using clozapine, it may make you feel drowsy. You must let your doctor know if you start to smoke, or stop smoking while, you are taking clozapine.

What sort of side-effects might I get if I am taking Clozapine?

Most people experience:

- Feeling very sleepy
- Dribbling/Drooling
- Feeling dizzy when standing up
- Weight gain
- Constipation (see your doctor if you experience extreme constipation)

Do not feel concerned by this list of side effects. Some people experience no side effects at all. If you think you might have a side effect to your medicine, you should ask your prescriber, doctor, or pharmacist. Do not share your medicine with others.

Lab tests and examination for Clozapine treatment?

Clozapine treatment requires some lab tests and investigations to be done at specific times. Please talk to your doctor or pharmacist regarding this.

Can I drive or cycle while I am taking Clozapine?

You may feel a bit sleepy at first when taking clozapine. It may slow down your reaction time. Until this wears off, or you know how clozapine affects you, do not drive or operate machinery.

ما هي الآثار الجانبية التي قد تحدث إذا كنت أتناول دواء

كلوزابين؟

يكون الكثير من الناس عرضة للإصابة بما يلي:

- الشعور بالنعاس الشديد
- سيلان الفم الشديد
- الشعور بالدوار عند الوقوف
- زيادة الوزن
- الإمساك عليك باستشارة طبيبك إذا أصبح الوضع سيئ

لا ينبغي عليك أن تشعر بالقلق من هذه القائمة من الآثار الجانبية. لا يتعرض بعض الناس لأي من الآثار الجانبية على الإطلاق، إذا كنت تعتقد أن لديك مشكلة مع الآثار الجانبية، فعليك باستشارة أي من الطبيب أو الصيدلي.

التحاليل الخاصة بالكلوزابين ؟

يحتاج العلاج بالكلوزابين لاجراء بعض التحاليل والفحوصات بصورة دورية. برجاء التحدث مع طبيبك أو الصيدلي بخصوص ذلك.

هل يمكنني القيادة،أو ادارة أو تشغيل الماكينات أثناء تناول دواء كلوزابين؟

قد تشعر بالنعاس قليلا في البداية عند تناول دواء كلوزابين. قد يبطئ الدواء من زمن رد الفعل الخاص بك. حتى وقت معرفتك بكيفية تأثير دواء كلوزابين عليك، كن حذرا أثناء القيادة أو تشغيل الآلات.

ما هي استخدامات كلوزابين؟

يستخدم دواء كلوزابين–لييونكس اساسا للمساعدة في علاج أعراض الفصام لدى الأشخاص الذين لم يحققوا أفضل نتائج مع دواءين إثنيين على الأقل من مضادات الفصام الأخرى، وللمساعدة في إيقاف هذه الأعراض من العودة.

ما هي الجرعة المعتادة لدواء كلوزابين؟

الجرعة المعتادة لدواء كلوزابين هي حوالي ٣٠٠–٦٠٠ مجم يوميا ولكن يمكن أن تصل إلى ٩٠٠ مج يوميا.يبدأ العلاج بجرعات صغيرة وتزداد تدريجيا حتى تصل للجرعة المطلوبة.

ما هي كيفية ووقت تناول دواء كلوزابين؟

ابتلع الأقراص مع نصف كوب على الأقل من المياه سواء كان ذلك في وضع الجلوس أو الوقوف. قد يكون من الأسهل لك تناول الدواء أثناء الطعام حتى تتمكن من تذكره.

كم من الوقت يلزم قبل عمل المادة لفعالة لدواء الكلوزابين؟

قد يستغرق تأثير دواء كلوزابين عدة أسابيع للبدء في العمل، ويمكن أن يظهر تأثيره بعد عدة شهور.

كم من الوقت يلزمني للاستمرار في تناول دواء كلوزابين؟

إذا كان الدواء ذو تأثير بالنسبة لك، فقد تستمر في تناوله لسنوات عديدة جدا. يمكنك التحدث مع طبيبك حول هذا الموضوع.

هل يمكنني التوقف عن تناول دواء كلوزابين فجأة؟

لا يعتبر دواء كلوزابين عقار إدماني ولكن لا تتوقف عن تناوله فجأة، حتى لو كنت تشعر بتحسن. يمكن أن تعود الأعراض إذا تم إيقاف دواء كلوزابين في وقت مبكر جدا. قد يحدث هذا بعد أسابيع أو حتى شهور من التوقف. إذا كانت لديك مشكلة في الدم فقد تكون في حاجة إلى التوقف فجأة، ولكن فقط مع المتابعة الطبية.

ما الذي ينبغي على فعله إذا نسيت تناول جرعة من دواء كلوزابين في الوقت المناسب؟

يمكنك تناول الجرعة المنسية في أقرب وقت عند تذكرك لوقت الجرعة ما لم يكن هناك حوالي ٤–٦ ساعات من وقت أخذ الجرعة التالية. إذا تذكرت –بعد ذلك، فعليك فقط أخذ الجرعة التالية في وقتها المعتاد. لا تحاول تعويض ذلك بأخذ جرعتان في وقت واحد أو قد تكون عرضة للمزيد من الآثار الجانبية. إذا نسيت تناول الجرعة لأكثر من يومين ٤٨ ساعة فسوف تحتاج الي استشارة الطبيب المعالج او الصيدلي.

هل يمكنني شرب الكحول أو التدخين أثناء تناول دواء كلوزابين؟

ينبغي عليك أن تخبر طبيبك إذا بدأت في التدخين أو توقفت عن التدخين وأنت تتناول دواء كلوزابين لأنه قد يؤثر على مستوى الدواء ف الدم. قد يجعلك شرب الكحول مع الدواء تشعر بالنعاس أكثر.