

أقراص الميرتازابين

Mirtazapine Tablets



What is mirtazapine used for?

Mirtazapine is used to treat the symptoms of depression. It can also be used to treat the symptoms of anxiety. Mirtazapine can make you quite sleepy so it can help you to sleep, but should not be prescribed just for sleep problems without any other symptoms Mirtazepine comes in tablet form.

What is the usual dose of mirtazapine?

The usual dose of mirtazapine is 15-45 mg at bedtime for depression.

How and when should I take mirtazapine?

Swallow the tablets with half a glass of water whilst sitting or standing.

How long will mirtazapine take to work?

You may feel or notice the effect of mirtazapine in the first week of your treatment, and the effect will continue up to 8 weeks later. Some cases might take a long period of time to achieve a complete effect.

how long Will I need to take mirtazapine?

It depends on the symptoms that you are taking the medication for, and your medical history. It may continue from at least 6 month to many years.

Can I suddenly stop taking mirtazapine?

Mirtazapine is not addictive, but it is advisable that you do not stop taking it suddenly, even if you feel better. Your symptoms can return if it is stopped too early.

What should I do if I forget to take a dose of mirtazapine at the right time?

Take the missed dose as soon as you remember, unless it is within 12 hours of your next dose. If you remember within 12 hours of your next dose, you can just take the next dose as normal. Do not try to catch up by taking two doses at once as you may get more side effects.

Can I drink alcohol while I am taking mirtazapine?

Drinking alcohol while taking mirtazapine may make you feel sleepy. This is particularly important if you need to drive or operate machinery and you must seek advice on this.

What sort of side-effects might I get if I am taking mirtazapine?

Most people may get:

- Sleepiness
- Feel hungry
- Weight gain
- Dry mouth
- Dizziness.

Please see your doctor if you get:

- Rash and itchiness
- Feel that you want to harm yourself
- Get confused
- Sudden tiredness
- Muscle cramps

Do not be worried by this list of side effects. Some people may not get any side effects at all and others may get some side effects that are not listed here. If you think you may have side effects from your medication, you should see your doctor or pharmacist.

Can I drive or operate machinery while I am taking mirtazapine?

You may at first feel quite sleepy when taking mirtazapine. It may continue until the next day. It may also slow down your reaction time. Until this wears off, or you know how mirtazapine affects you, do not drive or operate machinery.

هل أستطيع تناول المشروبات الكحولية أثناء دواء الميرتازابين؟

شرب الكحول أثناء تناول الميرتازابين قد يجعلك تشعر بالنعاس أكثر. يعتبر هذا أمر مهم بشكل خاص إذا كنت بحاجة إلى قيادة السيارة أو تشغيل الآلات وينبغي عليك طلب المشورة في هذا الشأن.

ما هي الآثار الجانبية التي قد تحدث إذا كنت أتناول دواء ميرتازابين؟

يكون الكثير من الناس عرضة للإصابة بما يلي:

- النعاس.
- الشعور بالجوع بصورة أكبر . وزيادة الوزن، و جفاف الفم.
- الدوخة والدوار.

عليك باستشارة طبيبك في اليوم التالي إذا تعرضت للإصابة بما يلي:

- الطفح الجلدي والحكة.
- الشعور بأنك تريد إيذاء نفسك.
- التعب المفاجئ.
- وتشنجات العضلات والاضطراب.

لا ينبغي عليك أن تشعر بالقلق من هذه القائمة من الآثار الجانبية. لا يتعرض بعض الناس لأي من الآثار الجانبية على الإطلاق، والبعض الآخر قد يصاب ببعض الآثار الجانبية التي لم يتم سردها هنا. إذا كنت تعتقد أن لديك مشكلة مع الآثار الجانبية، فعليك باستشارة أي من الطبيب، أو الصيدلي.

هل يمكنني القيادة، أثناء تناول دواء ميرتازابين؟

قد تشعر بالنعاس قليلاً في البداية عند تناول دواء ميرتازابين. يمكن أن يستمر ذلك لليوم التالي. كن حذراً لأن الدواء قد يبطئ من زمن رد الفعل الخاص بك. وإلى حين وقت معرفتك بكيفية تأثير دواء ميرتازابين عليك، كن حذراً أثناء القيادة أو تشغيل الآلات.

ما هي استخدامات دواء ميرتازابين؟

يستخدم دواء ميرتازابين أساساً للمساعدة في علاج أعراض الاكتئاب. يمكن أن يستخدم أيضاً للمساعدة في علاج أعراض القلق. يمكن أن يجعلك دواء ميرتازابين تشعر بالنعاس لذلك فقد يساعدك على الذهاب إلى النوم ولكن لا يجب وصفه للنوم فقط بدون وجود أعراض أخرى. يوجد الدواء على هيئة أقراص.

ما هي الجرعة المعتادة من دواء ميرتازابين؟

الجرعة المعتادة من دواء ميرتازابين هي حوالي ١٥-٤٥ مج في وقت النوم لعلاج أعراض الاكتئاب.

ما هي كيفية ووقت تناول دواء ميرتازابين؟

ابتلع الأقراص مع نصف كوب على الأقل من المياه سواء كان ذلك في وضع الجلوس أو الوقوف.

كم من الوقت يلزم قبل عمل المادة الفعالة لدواء ميرتازابين؟

لعلاج الاكتئاب، سوف يبدأ التأثير في غضون أسبوع أو اثنين، وسوف يستمر ظهور التأثير خلال الأسابيع الثمانية المقبلة. بالنسبة لبعض الحالات الأخرى فقد يستغرق التأثير فترة أطول للعمل بشكل كامل.

كم من الوقت يلزمني للاستمرار في تناول دواء ميرتازابين؟

يعتمد هذا على ما هي الأعراض التي كنت تتناوله من أجلها والتاريخ المرضي الخاص بك. يمكن أن يستمر ذلك لمدة ٦ أشهر على الأقل أو ما يصل إلى سنوات عديدة.

هل يمكنني التوقف عن تناول دواء ميرتازابين فجأة؟

لا يعتبر دواء ميرتازابين عقار إدماني ولكن لا تتوقف عن تناوله فجأة، حتى لو كنت تشعر بتحسن. يمكن أن تعود الأعراض في حالة توقفها في وقت مبكر جداً.

ما الذي ينبغي على فعله إذا نسيت تناول جرعة من دواء ميرتازابين في الوقت المناسب؟

عليك بتناول الجرعة المنسية في أقرب وقت عند تذكرك لوقت الجرعة ما لم يكن هناك حوالي ١٢ ساعة على وقت أخذ الجرعة التالية إذا تذكرت بعد هذا الوقت، فقط تناول الجرعة التالية كما هي. لا تحاول تعويض ذلك بأخذ جرعتين في وقت واحد فقد تكون عرضة للمزيد من الآثار الجانبية.