

حقن البالبيريديون

Paliperidone Injection



ماهي استخدامات حقن باليبيريديون ؟

دواء باليبيريديون هو حقن طويلة المفعول يستخدم للمساعدة في علاج أعراض الذهان والفصام، ومنع عودة أعراضهم. يتم أخذ الحقن طويلة المفعول في العضل والذي يؤدي إلى استمرار فعالية دواء باليبيريديون تدريجياً لمدة شهر تقريباً. يمكن أن يحل هذا محل تناول الأقراص يومياً.

ما هي الجرعة المعتادة من حقن باليبيريديون ؟

الجرعة المعتادة من حقن باليبيريديون هي ١٥٠ مج للجرعة الأولى، و ١٠٠ مج للجرعة الثانية بعد أسبوع، وبعد ذلك من ٥٠ الى ١٥٠ مج كل شهر حسب رؤية الطبيب المعالج.

هل أستطيع تناول المشروبات الكحولية أثناء دواء

الباليبيريديون؟

شرب الكحول أثناء تناول دواء باليبيريديون فقد يجعلك ذلك تشعر بالنعاس أكثر.

ما هي كيفية تناول حقن باليبيريديون؟

ينبغي أن يتم إعطاء الحقنتين الأولتين في الذراع بعد ذلك يمكن أن يتم إعطاءها إما في عضلات الذراع أو في أحد الردفين.

كم من الوقت يلزم قبل عمل المادة الفعالة لحقن

الباليبيريديون ؟

عادة ما يبدأ التأثير في العمل خلال أسبوع أو نحو ذلك، مع استمرار ظهور التأثير التراكمي على مدى الأسابيع القليلة المقبلة.

كم من الوقت يلزمني للاستمرار في تناول حقن

الباليبيريديون ؟

يعتمد هذا على ماهية الأعراض التي كنت تتناولها من أجلها. يمكن أن يستمر ذلك لعدة سنوات تحدث مع طبيبك المعالج بخصوص ذلك.

هل يمكنني التوقف عن تناول حقن الباليبيريديون فجأة؟

لا يعتبر دواء باليبيريديون عقار إدماني ولكن ينصح بعدم التوقف عن تناوله فجأة، حتى لو كنت تشعر بتحسن. يمكن أن تعود الأعراض إذا توقفت عن تناوله في وقت مبكر جداً. قد يحدث هذا بعد أشهر من التوقف عن تناول دواء باليبيريديون.

ما الذي ينبغي على فعله إذا نسيت تناول جرعة من حقن

الباليبيريديون ؟

ينبغي عليك الاتصال بممرضك أو طبيبك لإعداد حقنة أخرى. قد تحتاج إلى جرعة مختلفة قليلاً في المرة القادمة للتأكد من عدم عودة الأعراض الخاصة بك مرة أخرى.

ما هي الآثار الجانبية التي قد تحدث إذا كنت أتناول حقن

الباليبيريديون؟

يكون معظم الناس عرضة للإصابة بما يلي:

- الشعور بتيبس العضلات.
- الرعشة الخفيفة أو التشنج.
- عدم الشعور بالارتياح.
- الصداع.
- الشعور بالدوار عند الوقوف.
- ألم بمكان إعطاء الحقن.

يكون الكثير من الناس عرضة للإصابة بما يلي:

- الإمساك.
- النعاس أثناء النهار.
- زيادة الوزن .
- قد يحدث للمرأة تغيرات في الصدر وعدم انتظام الدورة الشهرية أو انقطاعها.

عليك باستشارة طبيبك في اليوم التالي إذا تعرضت للإصابة بما يلي:

- الحمى المفاجئة.
- تيبس العضلات أو الرعشة.

لا ينبغي عليك أن تشعر بالقلق من هذه القائمة من الآثار الجانبية حيث لا يتعرض بعض الناس لأي من الآثار الجانبية على الإطلاق، والبعض الآخر قد يصاب ببعض الآثار الجانبية غير المذكورة هنا إذا كنت تعتقد أن لديك مشكلة مع الآثار الجانبية، فعليك باستشارة أي من الطبيب، أو الصيدلي.

هل يمكنني القيادة، أو إدارة أو تشغيل الآلات أثناء تناول

حقن الباليبيريديون ؟

قد تشعر بالنعاس قليلاً في البداية عند تناول دواء باليبيريديون. كن حذراً لأن الدواء قد يبطئ من زمن رد الفعل الخاص بك. حتى وقت انتهاء ذلك أو وقت معرفتك بكيفية تأثير دواء باليبيريديون؛ عليك أن تكون حذراً أثناء القيادة أو تشغيل الآلات.

What should I do if I forget a dose of paliperidone

palmitate?

Contact your nurse or doctor to arrange another injection. You may need a slightly different dose next time to ensure your symptoms do not return.

What side effects can paliperidone palmitate have?

Most people will get:

- Muscles feeling stiff
- A slight shake or tremor
- Feeling restless
- Headache
- Feeling dizzy when you stand up
- Pain where the injection is given

Many people may also get:

- Constipation (you can't poop)
- Sleepiness during the day
- Weight gain
- Women may have breast changes and irregular or no periods.

Contact your doctor in the next day if you get:

- Sudden fever.
- muscle stiffness or shakes.

Do not be worried by this list of side effects.

Some people get no side effects at all and

others may get some that are not listed here.

If you think you may have a side effect related

to your medication, you should ask your

prescribing , doctor, nurse or pharmacist.

Can I operate machinery while I am receiving

paliperidone palmitate?

You may feel a bit sleepy when you start your paliperidone injections which may slow down your reaction time. Until you know how the injections affect you, be careful if you need to drive or operate machinery.

What is Paliperidone palmitate used for?

Paliperidone palmitate is a long-acting injection used to help treat the symptoms of psychosis and schizophrenia, and to prevent them from returning. A long-acting injection is injected into a muscle and releases paliperidone slowly over a month. This can replace the need to take tablets every day.

What is the usual dose of paliperidone palmitate

injection?

The usual dose of paliperidone is 150mg for the first dose, 100mg for the second dose a week later, then 50-150mg every month after that based on the doctor's advice.

Can I drink alcohol with paliperidone palmitate?

Drinking alcohol while receiving Paliperidone can make you feel sleepy than usual.

How is paliperidone palmitate administered?

The first two injections have to be given in the arm (deltoid muscle). After that it can be injected into either the muscles in the arm or in one of your buttocks.

How long will paliperidone palmitate take to work?

It will usually start working within a week or so and the effects will continue the following few weeks.

How long will I need to receive paliperidone

palmitate for?

This will depend on what you are taking it for. It could be for several years. Talk to your physician about this.

Can I suddenly stop having paliperidone palmitate?

Paliperidone is not addictive but it is advisable not to stop your injections suddenly, even if you feel better. Your symptoms can return if you stop the injections too early and may occur months after stopping.