

هل لدى طفلك حساسية غذائية؟



هل لدى طفلك حساسية غذائية؟

١

ما هي الحساسية الغذائية؟

عندما يكون لديك حساسية غذائية ، فإن جسمك وعن طريق الخطأ، يرى أن هذا الطعام يشكل تهديداً، فيقوم الجهاز المناعي في الجسم بمحاجمة هذا التهديد (أو ما يدعى أيضاً بالمؤرج). وتتراوح استجابة الجسم لهذا التحسس (أو ما يدعى بالتفاعل أو الارتكاس) بين خفيف إلى شديد مهدد للحياة.

إذا وجد الطبيب أن طفلك يعاني من حساسية غذائية فسوف يقوم بوصف دواء يدعى الإيبو نفرين

، يمكن استخدام هذا الدواء في حالات الإرتكاس التحسسي الشديد للمساعدة في عدم تفاقمه، ويدعى الارتكاس التحسسي الشديد بالتأق.

ما هي الأطعمة التي يتحسس لها الأشخاص عادة؟

يمكن أن يتحسس الأشخاص لأي نوع من الطعام، لكن هناك ثمانية أطعمة تعد الأكثر شيوعاً في تسببها بالحساسية، وهي: القول السوداني، المكسرات (كالجوز)، القشريات (مثل السلطعون، والجمبري)، السمك، الحليب، البيض، الصويا، القمح.



هل لدى طفلك حساسية غذائية؟

٢

ما الذي على فعله إذا شعرت بأن طفلي لديه حساسية غذائية؟

احجز موعداً مع طبيب طفلك بأسرع وقت ممكن، أو قم بزيارة أقرب مركز صحي لك.

لا تدع طفلك يأكل الطعام الذي قد يسبب له الحساسية ، ريثما تتواصل مع الطبيب.

تحدث مع طبيبك بخصوص الحصول على (الإببي نفرين) لعلاج التفاعلات التحسسية للأطعمة.

قم بزيارة www.foodallergy.org/nycps أو اتصل بـ ٤٠٠-٩٢٩-٨٠٠ ، وذلك إذا كنت في الولايات المتحدة الأمريكية لمزيد من المعلومات حول سؤال طبيبك ومعلومات أكثر عن الحساسية الغذائية.

إذا كان لدى طفلك علامات خطيرة للحساسية الغذائية كصعوبة التنفس أو تورم اللسان اتصل فوراً بـ ٩١١ (إذا كنت في الولايات المتحدة الأمريكية) أو بـ ٩٩٩ (إذا كنت في قطر)

هل تعلم ما هي علامات وأعراض الحساسية الغذائية؟

قد تكون الحساسية الغذائية مهددة للحياة، الخطوة الأولى هي معرفة ما عليك البحث عنه.

بعد تناول بعض الأطعمة، هل يحدث لطفلك أي من هذه الأعراض؟ قد تحدث الأعراض فجأة ، وتحدث عادة خلال دقائق إلى ساعتين بعد تناول الطعام.

إذا حدث لطفلك أي من الأعراض التالية بعد تناوله للطعام فإنه أو إنها تعاني من حساسية غذائية.

الأعراض الخفيفة :

الأنف (حكة/ سيلان الأنف ، العطاس)
الجلد (طفح خفيف، حكة خفيفة)
الأمعاء (غثيان خفيف، عدم ارتياح)
الفم (حكة بالفم)

حصول أكثر من عرض خفيف في أنحاء الجسم المختلفة يعتبر أيضاً من الأعراض الشديدة.

الأعراض الشديدة :

الرئتين (ضيق في التنفس، الوزير، السعال المتكرر)
القلب (التشعوب، الازفاق، الإغماء، النبض الضعيف، الدوار)
الحنجرة (شعور بالشد، بحة الصوت، صعوبة التنفس أو البلع)
الفم (تورم كبير باللسان أو الشفاه)
الجلد (طفح جلدي حك في كامل الجسم وإحمرار شديد)
الأمعاء (الإقياء)

من لديه حساسية غذائية؟ ومن لديه خطر الإصابة بها؟

أي شخص قد يعاني من حساسية غذائية.

١ من بين ١٣ طفل في الولايات المتحدة الأمريكية لديه حساسية غذائية.

بعض الأشخاص من لديهم حساسية غذائية، قد يكونون معرضين لخطر حدوث تفاعل تحسسي مهدد للحياة.

وهذا يتضمن الأشخاص المصابين بالربو والراهقين، وإن المراهقين معرضين أكثر من غيرهم لأنهم أكثر مجازفة للمخاطر من الآخرين، وهذه المخاطر تمثل بتجربة أطعمة قد تحتوي على مؤرج أو عدم التزامهم بحمل (الإببي نفرين) معهم دائمًا.

ما هو الفرق بين عدم تحمل الطعام والحساسية الغذائية؟

قد يتم الخلط أحياناً بين الحساسية الغذائية، وعدم تحمل الطعام.

يعن عدم تحمل الطعام شائعاً أكثر من الحساسية الغذائية ، كما أنه أقل خطراً منها.

عدم التحمل يعني بأن جسمك يعاني مشكلة في هضم الطعام، وهذا قد يجعلك تشعر بالسوء، وأحياناً يتراافق مع اضطراب بالمعدة، ولكنه ليس مهدداً للحياة، وأكثر أنواع عدم تحمل الطعام شيوعاً هو عدم تحمل اللاكتوز وهو السكر الطبيعي الموجود في الحليب.

بينما تعني الحساسية بأن جهازك المناعي يتفاعل اتجاه طعام ما، لأنه وعن طريق الخطأ اعتبرهذا الطعام مهدداً له، وتتراوح أعراض الحساسية بين خفيفة إلى شديدة مهددة للحياة.

الحساسية الغذائية	عدم تحمل الطعام.
أقل شيوعاً	أكثر شيوعاً
يؤثر على الجهاز المناعي.	يؤثر فقط على الجهاز الهضمي.
تظهر الأعراض بشكل تدريجي بطيء.	أقل خطورة.
تتضمن الأعراض والعلامات : حكة بالفم، انتفاخ، تشنجات، نفحة واقيء.	تتضمن الأعراض والعلامات : حكة بالفم، انتفاخ، تشنجات، نفحة واقيء.

أعراض أخرى (الشعور بإقتراب حدوث شيء ما سيء) .

كيف سيعبر الطفل عن حدوث تجربة الحساسية الغذائية ؟

قد يجد بعض الأطفال صعوبة في التعبير عما يشعرون به خلال حدوث التفاعل التحسسي، قد يضعون أصواتهم في فهم أو يسحبون أو يحكون لسانهم كردة فعل تجاه هذا التفاعل، قد تتغير أصواتهم (كمثال حدوث بحة بالصوت أو صرير) وقد يصبح لسانهم مبهماً .

وقد يقولون أشياء كهذا :

- أشعر بأن شيء ما يلکز لسانني.
- لسانني يحكني.
- أشعر وكأن هناك شعراً على لسانني.
- أشعر وكأن هناك تورماً في مؤخرة لسانني.
- أشعر بتتميل في فمي.
- أشعر بأن فمي غريباً.
- أشعر بأن شيئاً ما قد علق في حنجرتي.
- أشعر بأن شفتاي مشدودتين.
- أشعر وكأن هناك حشرات تطن في أذني.

للمزيد من المعلومات :

معلومات للذين شخص لديهم حديثاً حساسية غذائية :

www.foodallergy.org/resources/newly-diagnosed

المصادر الأكثر شيوعاً :

www.foodallergy.org/most-popular-resources

الاتصال بمكتب FARE المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية :

www.foodallergy.org/northeast

ايجاد مجموعة دعم محلية في الولايات المتحدة الأمريكية :

www.foodallergy.org/support-groups

لمزيد من المعلومات حول الحساسية الغذائية تفضلوا بزيارة موقعنا :

<http://aiap.hamad.qa>



إعداد د. مهدي العادلي

استشاري أمراض المناعة والحساسية، برنامج التوعية
بأمراض المناعة والحساسية، مؤسسة حمد الطبية

برنامج التوعية بأمراض المناعة والحساسية

AIAP@hamad.qa @

تقدير المرضى وأسرهم

patienteducation@hamad.qa @

© مؤسسة حمد الطبية ٢٠١٧