

# فهم أدوية السل الخاصة بك

## أدوية الخط الثاني المضادة للدرن (السل الرئوي)





وهي مضادات حيوية تستخدم لعلاج عدوى الدرن (السل) المقاوم عندما لا تكون عوامل الخط الأول فعالة ضد السل أو في حالة عدم تحمل أدوية الخط الأول المعتادة.

- أميكاسين
- موكسيفلوكساسين
- الليفوفلوكساسين
- السيكلوسيرين
- إيثيوناميد
- كلوفازيمين
- لينزوليد
- بيداكويلين
- بريثومانيد

### المتابعة

الاسم	طريقة اعطاء العلاج	متى تأخذ العلاج	الأعراض الجانبية الشائعة	المتابعة
أميكاسين (Amikacin)	اجره في العضل او في الوريد		الدوخة، فقدان السمع، تنميل ووخز في اليدين والقدمين، انخفاض في كمية البول	اختبار وظائف الكلى اختبار السمع
موكسيفلوكساسين (Moxifloxacin)	مرة واحدة يوميًا عن طريق الفم (في نفس الوقت كل يوم)	يؤخذ مع الطعام أو بدون طعام	صداع، غثيان، قيء، ألم وتورم في المفاصل أو الأوتار، آلام العظام، اضطراب المعدة، الإمساك والإسهال	مخطط كهربية القلب (ECG) ألم وتورم في الأوتار مستوى الجلوكوز في الدم (خاصة لدى مرضى السكري)

الاسم	طريقة اعطاء العلاج	متى تأخذ العلاج	الأعراض الجانبية الشائعة	المتابعة
الليفوفلوكساسين (Levofloxacin)	مرة واحدة يوميًا عن طريق الفم (في نفس الوقت كل يوم)	يؤخذ مع الطعام أو بدون طعام	الصداع، الغثيان، القيء، ألم وتورم في الأوتار، تصلب المفاصل، آلام العظام، الرعشة، اضطراب المعدة، الإمساك والإسهال	مخطط كهربية القلب (ECG) ألم وتورم في الأوتار مستوى الجلوكوز في الدم (خاصة لدى مرضى السكري)
السيكلوسيرين (Cycloserine)	مرة واحدة يوميًا عن طريق الفم (في نفس الوقت كل يوم)	يؤخذ مع الطعام أو بدون طعام	تنميل ووخز في اليدين والقدمين، تغيرات في المزاج والسلوك، فقدان الذاكرة، صعوبة في التركيز	فحص وظائف الكلى التحقق من التنميل في اليدين والقدمين التحقق من التغيرات في المزاج
إيثيوناميد (Ethionamide)	مرة واحدة يوميًا عن طريق الفم عند النوم	يؤخذ مع الطعام أو بدون طعام	طفح جلدي، غثيان، قيء، آلام في المعدة، عدم انتظام الدورة الشهرية وانخفاض مستوى السكر في الدم	فحص وظائف الكبد مخطط كهربية القلب (ECG) ألم وتورم في الأوتار مستوى الجلوكوز في الدم (خاصة لدى مرضى السكري)
كلوفازيمين (Clofazimine)	مرة واحدة يوميًا عن طريق الفم (في نفس الوقت كل يوم)	يؤخذ مع الطعام	صداع، طفح جلدي، غثيان، قيء، ألم في الصدر، فقدان الشهية، ألم في المفاصل	مخطط كهربية القلب (ECG) تقلبات في المزاج

## ماذا علي أن أفعل إذا نسيت أخذ جرعة العلاج؟

- تناول الجرعة الفائتة حالما تتذكر.
- إذا كان الوقت قد حان لجرعتك المعتادة التالية ، انتظر حتى ذلك الحين لتناول الدواء وتخطي الجرعة الفائتة.
- لا تأخذ جرعتين في نفس الوقت.

## ما هي الاحتياطات التي يجب أن أتخذها قبل تناول هذه الأدوية المضادة للدرن؟

- أخبر الطبيب / الصيدلي / الممرضة إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي دواء.
- أخبر الطبيب / الصيدلي / الممرضة عن الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة التي تتناولها.
- أخبري الطبيب إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو مرضعة.
- أخبر الطبيب إذا كنت مصاباً أو سبق أن أصبت بمرض في الكبد أو أي امراض اخرى.

## كيف يتم تخزين الدواء؟

- قم بتخزين الدواء في مكان بارد وجاف.
- يحفظ بعيداً عن الرطوبة والحرارة والضوء المباشر.
- احتفظ بجميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال

الاسم	طريقة اعطاء العلاج	متى تأخذ العلاج	الأعراض الجانبية الشائعة	المتابعة
لينزوليد (Linezolid)	مرة واحدة يومياً عن طريق الفم (في نفس الوقت كل يوم)	يؤخذ مع الطعام أو بدون طعام	الحمى، الصداع، طفح جلدي، حكة، دوخة، تغيرات في الرؤية، طعم غير مستحب في الفم، نزيف أو كدمات، تميل أو شعور بوخز في اليدين والقدمين، الغثيان، القيء، ألم في المعدة، الإسهال أو الإمساك.	فحص الدم (CBC)
بيداكويلين (Bed aquiline)	مرة واحدة يومياً عن طريق الفم (في نفس الوقت كل يوم)	يؤخذ مع الطعام	صداع، غثيان وقيء، السعال المصحوب بالدم، وفقدان الشهية، ألم في الصدر، ألم في المفاصل، وطفح جلدي.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مخطط كهربائية القلب (ECG)</li> <li>• وظائف الكبد</li> </ul>
بريتومانيد (Pretomanid)	مرة واحدة يومياً عن طريق الفم (في نفس الوقت كل يوم)	يؤخذ مع الطعام	صداع، حب الشباب، طفح جلدي، حكة، تميل ووخز في اليدين والقدمين، اضطراب في المعدة، غثيان، تغير في حدة النظر، أعراض انخفاض السكر في الدم، السعال.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تخطيط القلب (ECG)</li> <li>• وظيفة الرؤية</li> <li>• اختبارات وظائف الكبد</li> <li>• تحليل الدم الكامل (CBC)</li> </ul>

في حالة ظهور علامات رد فعل تحسسي (مثل الطفح الجلدي أو الاحمرار أو الحكة أو تورم الوجه أو صعوبة التنفس أو الدوخة) أو علامات تلف الكبد (مثل آلام المعدة أو الغثيان أو القيء) أو مشاكل في القلب (مثل خفقان القلب، ألم في الصدر، دوخة، وصعوبة في التنفس. توقف عن تناول الأدوية المضادة للدرن (السل) زمراجعة اقرب مركز طواريء

يمكنك زيارة العيادات في مركز الأمراض الإنتقالية خلال أيام الأسبوع من الساعة ٧:٠٠ صباحاً حتى ٣:٠٠ مساءً، وغرفة العلاج خلال أيام الأسبوع من الساعة ٢:٠٠ مساءً حتى ٨:٠٠ مساءً، وفي عطلات نهاية الأسبوع من الساعة ٧:٠٠ صباحاً حتى ٨:٠٠ مساءً، أو غرفة الطوارئ بعد الساعة ٨:٠٠ مساءً.

