

أقراص الأولانزابين

Olanzapine Tablets



What is olanzapine used for?

Olanzapine is mainly used to help treat the symptoms of psychosis, schizophrenia and bipolar mania, prevent them from returning. It comes in tablet form, including tablets that melt-in-the-mouth (Velotab).

What is the usual dose of olanzapine?

The usual dose of olanzapine tablets is around 10-20mg a day. It should be lower in older people.

How and when should I take olanzapine?

Swallow the tablets with at least half a glass of water whilst sitting or standing. **For the melt-in-the-mouth tablets, just put them on your tongue and they will dissolve quickly.** If the label says to take it once a day, it may be better to take it at bedtime as they may make you sleepy at first. Taking it at mealtimes may make it easier for you to remember.

How long will olanzapine take to work?

It can start to work in a couple of days and the effect should build over the next few weeks.

How long will I need to keep taking olanzapine for?

This will depend on what you are taking it for. Talk to your doctor about this.

Can I stop taking olanzapine suddenly?

Olanzapine is not addictive but it is advisable not to stop taking it suddenly, even if you feel better. Your symptoms can return if olanzapine is stopped too early. This may occur weeks or even months after stopping.

What should I do if I forget to take a dose of olanzapine at the right time?

Take the missed dose as soon as you remember unless it is within about 12 hours of your next dose. If you remember after this amount of time, just take the next dose as normal. Do not try to catch up by taking two doses at once as you may get more side effects.

Can I drink alcohol while I am taking olanzapine?

Drinking alcohol while taking olanzapine may make you feel sleepier.

What sort of side effects could I get if I am taking olanzapine?

Most people will experience:

- Sleepiness.
- weight gain.

Some people may also get:

- Feeling dizzy when you stand up , hypotension.
- Constipation.
- swollen ankles.

Contact your doctor immediately if you get:

- Sudden fever.
- muscle stiffness or shakes.

Do not be worried by this list of side effects. Some people get no side effects at all and others may experience some side effects that are not listed here. If you think

you may have a side effect from your medicine, you should ask a doctor or pharmacist.

Can I drive or operate machinery while I am taking olanzapine?

You may feel a bit sleepy at first when taking olanzapine. It may also slow down your reaction times. Until this wears off, or you know how olanzapine affects you, do not drive or operate machinery.

ما الذي ينبغي على فعله إذا نسيت تناول جرعة من دواء أولانزابين في الوقت المناسب؟

عليك بتناول الجرعة المناسبة في أقرب وقت عند تذكرك لوقت الجرعة ما لم يكن هناك حوالي ١٢ ساعة على وقت أخذ الجرعة التالية إذا تذكرت بعد هذا الوقت، فقط تناول الجرعة التالية كما هي. لا تحاول تعويض ذلك بأخذ جرعتين في وقت واحد حتى لا تكون عرضة للمزيد من الآثار الجانبية.

هل أستطيع تناول مشروبات الكحولية أثناء دواء أولانزابين؟

شرب الكحول أثناء تناول دواء أولانزابين قد يجعلك تشعر بالنعاس أكثر.

ما هي الآثار الجانبية التي قد تحدث إذا كنت أتناول دواء أولانزابين؟

يكون الكثير من الناس عرضة للإصابة بما يلي:

- النعاس.
 - زيادة الوزن.
- يكون بعض الناس أيضاً عرضة للإصابة بما يلي:
- الشعور بالدوار عند الوقوف ، انخفاض ضغط الدم.
 - الإمساك.
 - تورم الكاحلين.

عليك باستشارة طبيبك مباشرة إذا تعرضت للإصابة بما يلي:

- الحمى المفاجئة.
- تيبس العضلات أو الرعشة.

لا ينبغي عليك أن تشعر بالقلق من هذه القائمة من الآثار الجانبية. لا يتعرض بعض الناس لأي من الآثار الجانبية على الإطلاق، والبعض الآخر قد يصاب ببعض الآثار الجانبية غير مذكورة هنا.. إذا كنت تعتقد أن لديك مشكلة مع الآثار الجانبية، فعليك باستشارة أي من الطبيب، أو الصيدلي.

هل يمكنني القيادة، أو إدارة أو تشغيل الآلات أثناء تناول دواء أولانزابين؟

قد تشعر بالنعاس قليلاً في البداية عند تناول دواء أولانزابين. كن حذراً لأن الدواء قد يبطئ من زمن رد الفعل الخاص بك. حتى وقت انتهاء ذلك أو حين معرفتك بكيفية تأثير دواء أولانزابين عليك، كن حذراً أثناء القيادة أو تشغيل الآلات.

ما هي استخدامات دواء أولانزابين؟

يستخدم دواء أولانزابين المعروف أيضاً باسم زيبريكسا أساساً للمساعدة في علاج أعراض الذهان والفصام والهوس (الاضطراب الوجداني) ثنائي القطب، وللمساعدة في وقف عودة هذه الأعراض. تم إنتاج الدواء على شكل أقراص، وأقراص تذوب في الفم.

ما هي الجرعة المعتادة من دواء أولانزابين؟

الجرعة المعتادة من أقراص أولانزابين هي حوالي ١٠ إلى ٢٠ مجم يومياً ينبغي أن تكون الجرعة أقل من ذلك للأشخاص الأكبر سناً.

ما هي كيفية ووقت تناول دواء أولانزابين؟

ابتلع الأقراص مع نصف كوب على الأقل من المياه سواء كان ذلك في وضع الجلوس أو الوقوف. **لأقراص التي تذوب في الفم، عليك بوضعها مباشرة فقط على لسانك، وسوف تذوب بسرعة.** إذا وصف الطبيب الدواء مرة واحدة في اليوم فمن الأفضل لك تناوله في وقت النوم لأن ذلك قد يجعلك تشعر بالنعاس في البداية. إذا تناولت الدواء مع موعد وجبات الطعام فقد يكون من الأسهل لك أن تتذكره.

كم من الوقت يلزم قبل عمل المادة الفعالة لدواء أولانزابين؟

يمكن أن يبدأ تأثير الدواء في العمل خلال بضعة أيام، وسوف يستمر ظهور التأثير على مدى الأسابيع القليلة المقبلة.

كم من الوقت يلزمني للاستمرار في تناول دواء أولانزابين؟

يعتمد هذا على ماهية الأعراض التي كنت تتناولها من أجلها. يمكنك التحدث مع طبيبك حول هذا الموضوع.

هل يمكنني التوقف عن تناول أولانزابين فجأة؟

لا يعتبر دواء أولانزابين عقار إدماني ولكن لا ينصح بالتوقف عن تناوله فجأة، حتى لو كنت تشعر بتحسن. يمكن أن تعود الأعراض إذا تم إيقاف أولانزابين في وقت مبكر جداً. قد يحدث هذا بعد أسابيع أو حتى شهور بعد التوقف.